

COMMUNICATIONS

---

ÉTUDE D'UNE COLLECTION D'OISEAUX DU SUD DU HUNAN (CHINE),

PAR M. K. Y. YEN,

(Suite).

62. *Garrulax cineraceus cinereiceps* (Styan). — 1 ♀, 6 juin 1930, Chin-tung-chan. — « Sédentaire et commun. Malgré la médiocrité de son chant, il est parfois gardé comme Oiseau de cage ». (Ho.)

63. *Garrulax canorus canorus* (L.). — 1 ♂, 1 ♀ ad., 12, 24 avril 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et très commun. On le garde volontiers comme Oiseau de chant et de combat. » (Ho.)

64. *Garrulax perspicillatus* (Gm.). — 1 ♂, 1 ♀ ad., 13, 19 avril 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et très commun. Il vit toujours en petites bandes et voltige de buisson en buisson près des champs cultivés. Il est d'un naturel très criard, surtout en été, pendant l'époque des amours » (Ho.)

65. *Garrulax sannio* Swinhoc. — 1 ♂, 1 ♀ ad., 10, 11 avril 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et très commun. Il a à peu près les mêmes mœurs que son congénère, *G. perspicillatus*. » (Ho.)

66. *Pomatorhinus ruficollis stridulus* Swinhoe. — 1 ♂, 1 ♀ ad., 17, 21 avril 1930, Woo-kang. — Ces deux spécimens, quoique bien adultes, me semblent avoir l'aile plus courte que leurs homologues du Fohkien et du nord du Kwang-tung (♂ 73 mm., ♀ 69 mm. contre ♂ 75-77 mm., ♀ 70-74 mm.). Une plus longue série est nécessaire pour étudier à fond cette question. — « Sédentaire et très commun. Il se cache toujours soit dans les jungles de bambous, soit dans d'autres buissons très denses, ce qui le rend très difficile à obtenir. » (Ho.)

67. *Pomatorhinus Swinhoei abbrevialis* Stresem. — 1 ♂ ad., 4 juin 1930, Chin-tung-chan. — A cause de son aile un peu plus courte (96 mm.), cet exemplaire paraît correspondre mieux à la race de Yaoschan qu'à la race typique qui a une aile de 98-106 mm.

pour le mâle, et 93-98 mm. pour la femelle, mais ces différences sont en réalité assez faibles. — « Sédentaire et rare. » (Ho.)

68. *Alcippe nepalensis Hueli* A. David. — 1 ♂, 8 juin 1930, Chin-tung-chan. — « Sédentaire et très commun. » (Ho.)

69. *Alcippe cinereiceps Berliozii* Yen. (*Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 2<sup>e</sup> S., t. IV, 1932, p. 381). — 1 ♂, 1 ♀ ad., 18 mai 1930, Chin-tung-chan. — « Oiseau montagnard qui vit toujours dans la forêt et ne descend jamais dans les plaines. Son cri ressemble beaucoup à celui du *Zosterops*. » (Ho.)

70. *Siva torqueola* Swinhoe. — 1 ♂ ad., 7 juin 1930, Chin-tung-chan. — « Sédentaire et très commun. Il vit toujours en petites bandes. » (Ho.)

71. *Siva cyanouroptera Wingatei* O.-Grant. — 1 ♂, 1 ♀ ad., 17, 20 mai 1930, Chin-tung-chan. — Par comparaison avec les spécimens du Muséum de Paris, ces deux exemplaires sont tout à fait semblables à ceux du Yunnan, localité typique de cette race, tandis que neuf autres collectés en hiver par M. Delacour au Tonkin, me semblent avoir une tête plus bleue et le dessous du corps plus jaunâtre et moins gris. — « Oiseau sédentaire et très commun. » (Ho.)

72. *Leiothrix lulea lulea* (Scop.). — 1 ♂, 1 ♀ ad., 16, 26 mai 1930, Chin-tung-chan. — « Sédentaire et très commun. On le garde aussi comme oiseau de cage à cause de son chant mélodieux et de sa belle coloration. » (Ho.)

73. *Minla ignotincta Jerdoni* Verreaux. — 5 ♂ ad., 18-26 mai; 3 ♀ ad., 16-23 mai 1930, Ching-tun-chan. — Chcz cet Oiseau, le dos est gris olive et le dessous du corps jaunâtre, flamméché d'olive pâle, ce qui permet de le distinguer du *M. i. Mariæ*. La Touche du Yunnan et de Laokay, qui a le dos brun olive et le dessous du corps d'un jaune très vif. Mais entre ces deux formes, il existe à Yaoschan, dans le Kwangsi, une forme intermédiaire qui a le dos gris olive comme le *Jerdoni*, et le dessous du corps d'un jaune vif comme le *Mariæ*. Dr. Stresemann l'a nommé *M. i. Sini*. — « A Chin-tung-chan, cet Oiseau est très commun. Il est très familier et ne s'enfuit guère en présence des hommes. » (Ho.)

74. *Microscelis leucocephalus* (Gm.). — 1 ♂ ad., 3 juin; 1 ♀ ad., 3 mai 1930, Chin-tung-chan. — Parmi ces deux exemplaires, la tête, le cou et la poitrine du mâle, ainsi que le front de la femelle, sont blancs. — « Très commun à cette époque de l'année. Il forme des bandes considérables et cherche sa nourriture d'arbres en arbres, toujours en criant. Dans chaque bande, les individus à tête

blanche sont beaucoup moins nombreux que ceux à tête noire. » (Ho.)

75. *Ixos Maccllellandi Holli* (Swinhoe). — 1 ♂ ad., 10 juin 1930, Chin-tung-chan. — « Sédentaire et très commun. » (Ho.)

76. *Pycnonolus sinensis Slresemanni* La Touche. — 1 ♂, 1 ♀ ad., 9, 19 avril 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et très commun. Il vit soit par petites bandes, soit par couples, mais jamais solitaire. Son chant est assez sonore, mais simple, et il le fait entendre surtout le matin. Sa nourriture consiste en fruits, en baies et en insectes qu'il capture très souvent au vol comme les Gobe-mouches. » (Ho.)

77. *Pycnonolus xanthorrhous xanthorrhous* And. — 1 ♂ ad., 20 avril 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et très commun. » (Ho.)

78. *Spiziros semitorques semitorques* Swinhoe. — 1 ♂, 1 ♀ ad., 10, 14 avril 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et très commun. » (Ho.)

79. *Lalage melaschistos avensis* (Blyth.). — 1 ♂, 1 ♀ ad., 14, 20 avril 1930, Woo-kang. — « Très commun à cette époque de l'année. » (Ho.)

80. *Pericrocotus solaris mandarinus* Stresemann. — 1 ♂ ad., 4 juin 1930, Chin-tung-chan. — « Très commun. » (Ho.)

81. *Pericrocolus roseus cantonensis* Swinhoe. — 1 ♂ ad., 20 avril 1930, Woo-kang. — « Aussi commun que le précédent. » (Ho.)

82. *Dicrurus macrocercus cathæcus* Swinhoe. — 1 ♂ ad., 6 mai; 1 ♀ imm., 12 avril 1930, Woo-kang. — Chez le spécimen femelle, les plumes des parties inférieures ainsi que les sous-alaires sont terminées de blanc, caractère de jeune, assez surprenant à cette époque. — « Très commun. » (Ho.)

83. *Dicrurus leucogenys leucogenys* (Walden). — 1 ♂ ad., 6 mai; 1 ♀ ad., 30 avril 1930, Woo-kang. — « Très commun. Ses mœurs sont à peu près pareilles à celles de son congénère *D. m. cathæcus*, sauf que ce dernier visite très souvent le sous-bois tandis que le Drongo à face blanche reste toujours sur les plus hauts arbres. Tous deux peuvent attraper les insectes au vol. » (Ho.)

84. *Chibia hottentolla brevirostris* Cab. et Heine. — 1 ♂ ad., 3 mai 1930, Woo-kang. — « Aussi commun que les précédents. » (Ho.)

85. *Lanius schach schach* Linn. — 1 ♂, 25 avril 1930, Woo-kang.

86. *Lanius cristatus lucionensis* Linn. — 3 ♂ ad., 24, 29 avril; 1 ♀ ad., 24 avril 1930, Woo-kang. — « Très commun, ainsi que le précédent. » (Ho.)

87. *Lanius ligrinus* Drapiez. — 1 ♂, 1 ♀ ad., 1<sup>er</sup> mai 1930, Woo-kang, — « Moins commun que les deux précédents, mais quand même assez fréquent. » (Ho.)

88. *Parus major cinereus* Vieillot. — 1 ♂ ad., 18 avril 1930, Woo-kang. — « Oiseau sédentaire et très commun, se trouve non seulement dans les forêts de montagnes mais aussi sur les arbres des jardins. » (Ho.)

89. *Parus monticola monticola* Vigors. — 1 ♂ ad., 24 mai 1930, Chin-tung-chan. — « Oiseau sédentaire et assez commun. Contrairement à l'espèce précédente, il se tient toujours dans les forêts de montagnes et ne vient guère dans les plaines. » (Ho.)

90. *Aegithaliscus concinnus talifuensis* Sharpe. — 1 ♂ ad., 17 avril 1930, Woo-kang. — Cet exemplaire est tout à fait semblable aux spécimens du Yunnan qui se trouvent au Muséum de Paris : sa tête est roussâtre au lieu de châtain foncé comme chez la forme typique. Mais il est très curieux de trouver cette forme dans le Hunan, province très éloignée de Talifu (Yunnan), dont elle est séparée par le Kwei-chou et par le Kwangsi, d'où j'ai obtenu des spécimens de la forme typique, *A. c. concinnus* (Gould.). Peut-être les caractères distinctifs de ces sous-espèces sont-ils imparfaitement établis.

91. *Paradoxornis webbiana webbiana* (Gray). — 1 ♂ ad., 7 mai 1930, Chin-tung-chan. — « Sédentaire et assez commun. » (Ho.)

92. *Paradoxornis gularis fohkiensis* (A. David.) — 1 ♂, 4 juin 1930 Chin-tung-chan. — « Assez commun. » (Ho.)

93. *Sitta europæa sinensis* Verreaux. — 2 ♂ ad., 1 ♀ ad., 24, 30 avril 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et très commun. » (Ho.)

94. *Aethopyga Gouldi v. Dabryi* (Verreaux). — 1 ♂ ad., 1<sup>er</sup> juin 1930, Chin-tung-chan. — « Dans la montagne de Chin-tung-chan, cet Oiseau est très commun. Il se tient toujours sur les grands arbres pour y chercher sa nourriture qui consiste principalement en petits insectes. Quant à l'*Aethopyga Lalouchii* Slater, assez commun dans le Kwangsi, dans le Kwangtung et dans le Fohkien, que j'ai spécialement recherché, il n'a pas encore été rencontré. » (Ho.)

95. *Molacilla Yarrelli leucopsis* Gould. — 2 ♂ ad., 12 avril, 4 juin 1930, Woo-kang. — « Très commun. » (Ho.)

96. *Dendronanthus indicus* (Gm.). — 2 ♂ ad., 27 avril, 4 mai 1930, Woo-kang. — « Assez commun. » (Ho.)

97. *Anthus Hodgsoni Hodgsoni* Richm. — 1 ♀ ad., 27 avril 1930, Woo-kang. — « Très commun à cette époque. » (Ho.)

98. *Eophona migratoria migratoria* Hart. — 1 ♂ ad., 20 avril; 1 ♀ ad., 6 mai 1930, Woo-kang. — « Très commun à cette époque de l'année. » (Ho.) — La Touche a décrit une forme de cette espèce dans le Yunnan sous le nom de *E. m. Harterti*, qui différerait de l'*E. m. migratoria* par la coloration plus foncée et les dimensions plus fortes (*Bull. B. O. C.* vol. XLIII, p. 150, 1923). Or, au Muséum de Paris, se trouve un spécimen femelle adulte, collecté dans le Yunnan en juillet 1910 par Mmc Comby. Cet exemplaire, comparé à plusieurs femelles de *migratoria*, ne me paraît présenter aucune différence appréciable, ni dans la coloration, ni dans les dimensions (aile : 94 mm.), ni dans la grandeur du bec. Quoiqu'on ne puisse rien affirmer d'après une seule femelle, je crains toutefois que le *Harterti* soit une sous-espèce très faiblement différenciée.

99. *Chloris sinica sinica* (L.). — 1 ♀ ad., 27 avril 1930, Woo-kang. — « Très commun. » (Ho.)

100. *Passer montanus saturatus* Stejneger. — 1 ♂ ad., 30 avril 1930, Woo-kang. — « Oiseau sédentaire et très commun. » (Ho.)

101. *Passer rutilans rutilans* Temm. — 1 ♀ ad., 5 juin 1930, Chin-tung-chan. — « Assez commun. » (Ho.)

102. *Emberiza pusilla* (Pallas). — 1 ♀ ad., 18 avril 1930, Woo-kang. — « A cette époque de l'année, cet Oiseau est assez commun. » (Ho.)

103. *Emberiza elegans elegantula* Swinhœ. — 1 ♂ ad., 10 juin 1930 Chin-tung-chan. — Selon la date de capture, ce Bruant serait nichéur en cette région.

104. *Emberiza cioides castaneiceps* Moore. — 1 ♂ ad., 28 avril 1930 Woo-kang. — « Assez rare, probablement sédentaire. » (Ho.)

105. *Emberiza rutita* Pallas. — 1 ♂ ad., 28 avril 1930, Woo-kang. — « Assez commun, mais probablement seulement de passage. » (Ho.)

106. *Emberiza aureola* Pallas. — 1 ♂ ad., 2 mai 1930, Woo-kang. — « Assez commun. » (Ho.)

107. *Melophus melanicterus* (Gm.). — 1 ♀, 6 juin 1930, Chin-tung-chan. — « Sédentaire et commun. » (Ho.)<sup>2</sup> — « Tous les *Emberiza* et *Melophus* sont granivores. Ils cherchent toujours leur nourriture dans les rizières, où ils causent de grands dégâts aux récoltes. » (Ho.)

108. *Spodiopsar sericeus* (Gm.). — 1 ♂ 1 ♀ ad., 19 avril 1930, Woo-kang. — « Migrateur très commun. Vit en bandes plus ou moins nombreuses. » (Ho.)

109. *Acridotheres cristatellus cristatellus* (L.). — 1 ♂, 15 avril 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et très commun. » (Ho.)

110. *Oriolus chinensis diffusus* Sharpe. — 1 ♂, 1 ♀ ad., 25, 29 avril 1930, Woo-kang. — « Cet Oiseau passe tout l'été dans le sud du Hunan. » (Ho.)

111. *Corvus torquatus* Less. — 1 ♂ ad., 11 avril 1930, Woo-kang.

112. *Pica pica pica* (L.). — 1 ♂ ad., 10 avril 1930, Woo-kang. — « La Pie, ainsi que le Corbeau à collier blanc, sont sédentaires et très communs dans le sud du Hunan. » (Ho.)

113. *Urocissa erythrorhyncha erythrorhyncha* (Bodd.). — 1 ♂, 1 ♀ ad., 8, 20 avril 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et commun. Il vit en petites bandes dans les bois des collines et ne visite guère les villes. Par contre, la Pie vulgaire se trouve souvent aux environs des habitations et plus rarement dans les bois sauvages. » (Ho.)

114. *Garrulus glandarius sinensis* Swinhoe. — 1 ♂, 1 ♀ ad., 15, 18 avril 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et commun. » (Ho.)